

GUÍA DE CONVERSACIÓN CON EL MÉDICO

¿Estás preparado para hablar sobre la protección contra el VRS? Estas preguntas pueden ayudarte.

Si tienes un bebé menor de 8 meses, vale la pena hablar con tu pediatra sobre la protección contra la infección pulmonar grave por el VRS. Lleva esta lista de preguntas a la próxima cita de tu bebé para ayudarte a guiar la conversación.

+ Conoce acerca de Beyfortus

- ¿Cómo funciona Beyfortus?
- ¿Cuál es la diferencia entre una vacuna y Beyfortus?
- ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Beyfortus?
- ¿Dónde puede mi bebé recibir Beyfortus?
- ¿Qué tan rápido puede ayudar a proteger Beyfortus a mi bebé?
- ¿Puede durar la protección de Beyfortus durante toda la temporada del VRS?

+ Conoce cómo conseguir Beyfortus

- ¿Cuándo es el momento adecuado para que mi bebé reciba Beyfortus?
- ¿Puede mi bebé recibir Beyfortus al mismo tiempo que otras vacunas infantiles?
- ¿Beyfortus está cubierto por mi seguro?



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Tu hijo/a no debe recibir Beyfortus si tiene un historial de reacciones alérgicas graves a nirsevimab-alip o a cualquiera de los ingredientes de Beyfortus.

Antes de que tu hijo/a reciba Beyfortus, infórmale a su proveedor de atención médica sobre todas las afecciones médicas de tu hijo/a, incluso si ha presentado lo siguiente:

- si alguna vez ha tenido una reacción a Beyfortus.
- si tiene problemas de hemorragia o hematomas. Si tu hijo/a tiene un problema de hemorragia o sufre hematomas fácilmente, la inyección puede provocar problemas.

Infórmale a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma tu hijo/a, incluidos los medicamentos de venta libre y de venta con receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Tu hijo/a lactante no debe recibir el medicamento llamado palivizumab si ya recibió Beyfortus en la misma temporada del VRS.

Se han producido reacciones alérgicas graves con Beyfortus. Busca ayuda médica de inmediato si tu hijo/a tiene cualquiera de los siguientes signos o síntomas de reacción alérgica grave:

- hinchazón de la cara, la boca o la lengua
- dificultades para tragar o respirar
- sin capacidad de respuesta
- piel, labios o parte interior de las uñas de color azul
- debilidad muscular
- erupciones cutáneas, urticaria o prurito graves

Los efectos secundarios más comunes de Beyfortus son erupciones cutáneas y dolor, hinchazón o endurecimiento del punto de inyección de tu hijo/a. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Beyfortus.

INDICACIÓN

Beyfortus es un medicamento recetado que se usa para ayudar a prevenir una enfermedad pulmonar grave causada por el virus respiratorio sincitial (VRS) en:

- Recién nacidos y bebés menores de 1 año de edad nacidos durante o a inicios de su primera temporada del VRS.
- Niños de hasta 24 meses que siguen teniendo riesgo de sufrir una enfermedad grave por el VRS durante su segunda temporada del VRS.

Por favor, consulta la Información de prescripción completa, incluida la Información del paciente, en [Beyfortus.com/us-es](https://www.beyfortus.com/us-es)