

醫生討論指南

## 準備好談談RSV防護了嗎？ 這些問題可以幫助您

若寶寶未滿8個月，與兒科醫師討論如何預防嚴重的RSV肺部感染很重要。請將這份問題清單帶到寶寶的下次門診，幫助您與醫生討論。



### + 認識Beyfortus

- Beyfortus的作用原理是什麼？
- Beyfortus與疫苗的不同之處？
- Beyfortus有哪些可能的副作用？
- 我的寶寶可以在哪裡接種Beyfortus？
- Beyfortus多快可以開始幫助保護我的寶寶？
- Beyfortus的保護能維持整個RSV好發季節嗎？

### + 了解如何接種Beyfortus

- 我的寶寶什麼時候接種Beyfortus最合適？
- 我的寶寶能同時接種Beyfortus和其他常規疫苗嗎？
- Beyfortus是否在我的保險支付範圍內？



### 重要安全資訊

若您的孩子對nirsevimab-alip或Beyfortus的任何成分有嚴重的過敏反應史，請勿接種Beyfortus。

在您的孩子接種Beyfortus之前，請將孩子的所有醫療狀況告知您的醫療保健人員，包括如果孩子：

- 曾對Beyfortus出現反應。
- 曾發生出血或瘀青問題。若您的孩子有容易出血或瘀青的問題，可能因注射導致傷害。

請告知醫療保健人員關於孩子的所有用藥情況，包括處方和非處方藥物，維他命以及草本保健品。如果嬰兒在同一個RSV好發季節已經接種Beyfortus，請勿再使用palivizumab藥物。

使用Beyfortus藥物曾發生過嚴重的過敏反應。若您的孩子有以下嚴重過敏反應的徵兆或症狀，請立即尋求醫療協助：

- 臉部、嘴巴或舌頭腫脹
- 吞嚥或呼吸困難
- 無意識
- 皮膚、嘴唇或指甲內的顏色呈藍色
- 肌肉無力
- 嚴重紅疹、蕁麻疹或搔癢

Beyfortus最常見的副作用為紅疹與注射部位疼痛、腫脹或出現硬塊，但Beyfortus仍可能引發其他副作用。若您對副作用有任何疑慮，請聯繫醫療保健人員。

### 適應症

Beyfortus為處方藥物，用於幫助以下群體預防因感染呼吸道融合病毒（RSV）而導致的嚴重肺部疾病：

- 正值或進入第一個RSV好發季節時出生的新生兒或未滿1歲的嬰兒。
- 在第二個RSV好發季節仍有高風險罹患嚴重RSV疾病的24個月以下兒童。

請瀏覽[Beyfortus.com/cn](https://www.beyfortus.com/cn)，查閱完整處方說明與患者資訊。